



# 毒キノコに要注意

夏の気温が高く、その後の適度な降雨があり、朝晩の気温が低下すると、多くのキノコが発生することが考えられます。

⚠ 毎年、有毒キノコを原因とする食中毒が発生しています。  
食用のキノコと確実に判断できないキノコは

絶対に

**採らない! 食べない! 売らない! 人にあげない!**

⚠ キノコを食べて体調が悪くなったら、すぐに医師の診察を!

## ツキヨタケ



### 【中毒症状】

ツキヨタケは食後30分～1時間程度で嘔吐，下痢，腹痛などの中毒を起こす。

### 【間違えやすい植物】

- ・ヒラタケ
- ・ムキタケ
- ・シイタケ

## クサウラベニタケ



### 【中毒症状】

クサウラベニタケは食後20分～1時間程度で嘔吐，下痢，腹痛など消化器系の中毒を起こす。唾液の分泌、瞳孔の収縮、発汗などの症状も現れる。

### 【間違えやすい植物】

- ・ウラベニホテイシメジ
- ・ホンシメジ
- ・ハタケシメジ

## テングタケ



### 【中毒症状】

テングタケは食後30分程で嘔吐，下痢，腹痛など胃腸消化器の中毒症状が現れる。そのほかに，神経系の中毒症状，瞳孔の収縮，発汗，めまい，痙攣などで，呼吸困難になる場合もあり，1日程度で回復するが，古くは死亡例もある。

## ニセクロハツ



### 【中毒症状】

ニセクロハツは食後30分から数時間程度で嘔吐，下痢などの胃腸，消化器系の中毒症状を示す。その後18-24時間ほどで横紋筋溶解が原因と考えられる全身筋肉痛，呼吸困難を示し，死亡に至ることもある。